



Програма захисту ЯБЛУНІ

Шкідливий об'єкт											
	Умови застосування	Препарат	Миш'яні вушки	При наявності бур'янів	Розовий бутон	Закінчення цвітіння	1-ша дек. Листо	При наявності бур'янів	3 декада липня-1 декада серпня	Резервні обробки	
Захист від бур'янів											
Однорічні і багаторічні злакові та дводольні		Тотал		3				3			
		Тотал К		2				2			
Захист від хвороб											
Грунтова інфекція, стимулятор росту, підвищення імунітету	В умовах дефіциту вологи. Застосовувати окремо від пестицидів(в ґрунт, прикореневу частину рослини). Застосовувати окремо від пестицидів.	Endospor DM	0,25								
	Застосовувати окремо від пестицидів.	Бактивіа	0,25								
Парша, Моніліоз		Метеор		3							
Парша, борошниста роса		Ефатол			3	0,2	0,2		0,2		
		Тюфен			1,0-1,5	1	1		1		
		Стробітек			0,2	0,6-0,8	0,6-0,8		0,6-0,8	0,2	
		Стробітек Мільт			1	3	2		2	1	
		Бродвей			0,6-0,8	0,6-0,8	1,2		1,2	0,6-0,8	
Борошниста роса	При необхідності у баксову суміш	Байзафен		0,4							
		Універсал		0,2-0,3							
Парша	До початку формування плодів	Метеор								4	
Захист від шкідників											
Довгоносики	ЕПШ	Оперкот Акро	0,15								
		Фараон	1								
		Міст Супер	0,18								
		Оперкот	0,4								
		Ранчо	0,040								
Довгоносики, пильщик, листовертки, молі		Резонанс +			1						
		Оперкот			0,3						
		Оперкот			0,4						
Додатково попелиця, плодожерка		Фараон			1						
		Фостран			2						
		Оперкот Акро			0,2						
		Міст Супер			0,18						
		Траверс			0,4-0,5						
Комплекс шкідників	Сисні	Фостран +				2					
		Оперкот				0,2					
		Міст Супер				0,18					
		Оперкот Акро				0,2					
	Листогризуни	Резонанс +				1					
		Оперкот				0,3					
		Оперкот Акро				0,2					
		Міст Супер				0,18					
Каліф. Щитівка		Зеніт				0,3					
		Фостран				2					
		Траверс				0,4-0,5					
Листовертки, АББ		Резонанс +				1		1		1,5	
		Оперкот				0,3		0,3			
		Фараон						1			
Щитівки		Зеніт								0,3	
Кліщі		Гексоран								0,100	

УВАГА!!! Рекомендується додавати до всіх пестицидних обробок Стабілізатор BB5 для регулювання жорсткості і рН води 0,1-0,3 л/100 л води. Фунгіциди та інсектициди рекомендується застосовувати в баксовій суміші з СУПЕР ПАР (0,2 г/га), Супер КАП (0,1-0,2 л/га). Для запобігання пімоутворення при роботі з пестицидами застосовувати Супер Антифом 0,1 л/т т води. В період інтенсивного росту рослин для підвищення якості врожаю рекомендується застосовувати Сульфомат 5-10 кг/га, Акселератор Мікро 1-2 кг/га, Акселератор ВП 1-2 кг/га, Акселератор Гідро Бор 1-2 г/га.



ПРОГРАМИ
ЗАХИСТУ РОСЛИН